

اینا فائیلیکسس کو پہچانیں اور اس پر رد عمل ظاہر کریں

مشتبہ یا فعال کھانے کی الرجی کے رد عمل کے لیے

1

فوری طور پر ایپی
نیفرائن کا انجیکشن
لگائیں

2

911 پر کال کریں
ایپی نیفرائن کے ساتھ
ایمبولینس کی درخواست کریں۔

اضافی ادویات پر غور کریں
(ایپی نیفرائن کے بعد):
« اینٹی ہسٹامائین
« انہیلر (برونکوڈیلیٹر) اگر دمہ ہو

پوزیشن

« شخص کو فلیٹ پوزیشن میں لٹائیں اور پیروں
کو اٹھائیں۔
« اگر سانس لینے میں دشواری ہو یا انہیں الٹی ہو
رہی ہو تو انہیں بیٹھنے دیں یا پہلو پر لیٹنے دیں۔

اگلے اقدامات

« اگر علامات میں بہتری نہیں آتی ہے، یا علامات
واپس آجاتی ہیں، تو آخری خوراک کے بعد تقریباً
5 منٹ یا اس سے زیادہ دیر میں ایپی نیفرائن کی
مزید خوراکیں دی جا سکتی ہیں۔
« ER میں منتقل کریں اور کم از کم 4 گھنٹے تک
وہاں رہیں کیونکہ علامات واپس آ سکتی ہیں۔
ہنگامی رابطوں کو فوراً مطلع کریں۔

مندرجہ ذیل میں سے کسی کی شدید علامات

پھیپھڑے: سانس پھولنا، گھرگھراہٹ، بار بار کھانسی ہونا

دل: پیلی یا نیلی جلد، بے ہوشی، نبض کمزور ہونا، چکر آنا

گلا: گلے کا تنگ ہونا یا بیٹھنا، سانس لینے یا نکلنے میں
دشواری

منہ: زبان یا ہونٹوں میں زیادہ سوجن

جلد: جسم پر بہت سی چھپاکی، بہت زیادہ سرخی

غذائی نالی: بار بار الٹی ہونا، شدید اسہال

دیگر: یہ محسوس ہونا کہ کچھ برا ہونے والا ہے،
پریشانی، الجھن

یا ایک سے زیادہ ہلکی علامات

ناک: ناک میں کھجلی ہونا یا بہنا، چھینک آنا

منہ: منہ میں کھجلی ہونا

جلد: چند چھپاکی، ہلکی کھجلی

غذائی نالی: ہلکی متلی یا تکلیف

اینٹی ہسٹامائنز پر انحصار نہ کریں۔

شبہ ہونے پر ایپی نیفرائن دیں اور 911 پر کال کریں۔

